labopart
Medizinische Laboratorien

URINPROBE RICHTIG GEWINNEN

Mittelstrahlurin für Frauen

Mittelstrahlurin ist für die Diagnostik von Harnwegsinfektionen (Urinkultur) und die allgemeine Urinuntersuchung geeignet und wird nach Verwerfen der ersten Urinportion gewonnen. Er enthält weniger Verunreinigungen durch Keime und Zellen aus der Harnröhre und dem äußeren Genitalbereich.

1



Intimbereich reinigen

Schamlippen spreizen
Mit frischem feuchtem Tuch
von vorne nach hinten reinigen
Anschließend trocknen

2



Ersten Urin verwerfen

Lassen Sie den ersten Teil des Urins in die Toilette laufen.
Nicht auffangen!

3



Mittelstrahl auffangen

Fangen Sie anschließend etwa 10–20 ml Urin im Urinbecher auf.


4



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie den restlichen Urin wieder in die Toilette laufen.

5



Probe mit Monovette aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und Becher verwerfen.

6



Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette zeitnah in Ihrer Praxis oder im Labor ab.

Wichtig: Nur den Mittelstrahlurin im Becher sammeln. **www.labopart.de**

labopart
Medizinische Laboratorien

URINPROBE RICHTIG GEWINNEN

Erststrahlurin für Frauen

Für bestimmte Untersuchungen – zum Beispiel den Nachweis von Chlamydien oder Gonokokken – wird der Erststrahlurin benötigt: also die erste Urinportion. Sie enthält Zellen aus der Harnröhre, die für diese Tests wichtig sind. Für die meisten anderen Untersuchungen wird dagegen Mittelstrahlurin verwendet.

1



Intimbereich reinigen

Schamlippen spreizen
Mit frischem feuchtem Tuch
von vorne nach hinten reinigen.
Anschließend trocknen

2



Erststrahl auffangen

Fangen Sie die ersten etwa 10–20 ml Urin im Urinbecher auf.

3



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie den restlichen Urin wieder in die Toilette laufen.

4



Probe mit Monovette aufnehmen

Stopfen abnehmen und
Entnahmespitze aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach
oben ziehen und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze,
Kolbenstange und Becher verwerfen.

5



Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette
zeitnah in Ihrer Praxis oder im Labor ab.

Wichtig: Nur den ersten Urin im Becher sammeln. **www.labopart.de**


labopart
Medizinische Laboratorien

URINPROBE RICHTIG GEWINNEN

Mittelstrahlurin für Männer

Mittelstrahlurin ist für die Diagnostik von Harnwegsinfektionen (Urinkultur) und die allgemeine Urinuntersuchung geeignet und wird nach Verwerfen der ersten Urinportion gewonnen. Er enthält weniger Verunreinigungen durch Keime und Zellen aus der Harnröhre und dem äußeren Genitalbereich.

1



Penis reinigen

Vorhaut zurückziehen
Eichel mit frischem feuchtem Tuch reinigen
Anschließend trocknen

2



Ersten Urin verwerfen

Lassen Sie den ersten Teil des Urins in die Toilette laufen.
Nicht auffangen!

3



Mittelstrahl auffangen

Fangen Sie anschließend etwa 10–20 ml Urin im Urinbecher auf.


4



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie den restlichen Urin wieder in die Toilette laufen.

5



Probe mit Monovette aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und Becher verwerfen.

6



Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette zeitnah in Ihrer Praxis oder im Labor ab.

Wichtig: Nur den Mittelstrahlurin im Becher sammeln. **www.labopart.de**


labopart
Medizinische Laboratorien

URINPROBE RICHTIG GEWINNEN

Erststrahlurin für Männer

Für bestimmte Untersuchungen – zum Beispiel den Nachweis von Chlamydien oder Gonokokken – wird der Erststrahlurin benötigt: also die erste Urinportion. Sie enthält Zellen aus der Harnröhre, die für diese Tests wichtig sind. Für die meisten anderen Untersuchungen wird dagegen Mittelstrahlurin verwendet.

1



Penis reinigen

Vorhaut zurückziehen Eichel mit frischem feuchtem Tuch reinigen
Anschließend trocknen

2



Erststrahl auffangen

Fangen Sie die ersten etwa 10–20 ml Urin im Urinbecher auf.

3



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie den restlichen Urin wieder in die Toilette laufen.

4



Probe mit Monovette aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und Becher verwerfen.

5



Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit. Bitte geben Sie die Urin-Monovette zeitnah in Ihrer Praxis oder im Labor ab.

Wichtig: Nur den ersten Urin im Becher sammeln. **www.labopart.de**